

**MOBULIDAE**  
**mantas**

*Manta birostris*, manta voladora – Boca ancha y terminal; ancho de la cabeza cerca de dos veces el largo del disco; puede estar presente una espina grande (Bigelow & Schroeder 1948).

*Mobula hypostoma*, manta negra – Boca subterminal; ancho de la cabeza cerca de tres veces en el largo del disco; espina grande presente (Bigelow & Schroeder 1948).

**MYLIOBATIDAE**  
**chuchos**

*Aetobatus narinari*, chucho pintado – Lóbulo subrostral angosto y puntiagudo; superficie dorsal gris a negro con manchas blancas redondas (Jordan & Evermann 1900).

*Myliobatis goodei*, chucho amarillo – Lóbulo subrostral ancho y redondeado; superficie dorsal color gris o café (Bigelow & Schroeder 1948).

**Apuntes / Notes:**

**MOBULIDAE**  
**manta rays**

*Manta birostris*, giant manta – Mouth wide and terminal; head width about twice in disc length; large spine may be present.


*Mobula hypostoma*, devil ray – Mouth subterminal; head width about three times in disc length; large spine absent.

**MYLIOBATIDAE**  
**eagle rays**


*Aetobatus narinari*, spotted eagle ray – Subrostral lobe narrow and pointed; dorsal surface gray to black with rounded white spots.

*Myliobatis goodei*, Southern eagle ray – Subrostral lobe wide and rounded; dorsal surface plain gray or brown.

**MOBULIDAE**




*Manta birostris*




*Mobula hypostoma*

**MYLIOBATIDAE**



*Aetobatus narinari*



*Myliobatis goodei*