

GOBIESOCIDAE chupapiedras

Tomicodon fasciatus, chupapiedra de barras – Sin papilas en la región C del disco; coloración pardo claro con marcas pardo oscuro en el dorso y costados, extendiéndose a la región ventral (Guitart 1986, Briggs 1955).

Acyrtops beryllinus, chupapiedra verde – Un parche de papilas en forma de pera en la región C del disco; coloración verde esmeralda brillante con manchas y puntos blancos (Guitart 1986).

Rimicola brevis, chupapiedra enana – Disco pequeño, un parche de papilas en forma de barras en la región C del disco; coloración uniforme sin marcas oscuras (Briggs 1969).

Gobiesox punctulatus, chupapiedra punteada – Papilas aplanadas en la región C del disco en dos grupos bien separados; cabeza cubierta con manchas pardo oscuro, 2 barras blancas transversales que cruzan el dorso (Guitart 1986).

Acyrtops rubiginosus, chupapiedra roja – Papilas aplanadas en la región C del disco en dos grupos casi juntos; coloración roja uniforme o con bandas pardo oscuro transversales en la cabeza y cuerpo (Guitart 1986).

BREGMACEROTIDAE bacaletes

Bregmaceros atlanticus, bacaleta antena – Aletas anal y segunda dorsal bilobuladas con un margen muy cóncavo; un solo radio filamentosos constituye la primera aleta dorsal (Goode & Bean 1895).

Apuntes / Notes:

GOBIESOCIDAE clingfishes

Tomicodon fasciatus, barred clingfish – No papillae in disc region C; coloration light brown with dark brown markings on back, sides, extending to ventral surface.

Acyrtops beryllinus, emerald clingfish – A pear-shaped patch of papillae in disc region C; coloration bright emerald green with white spots and dots.

Rimicola brevis, pygmy clingfish – Disc small, a bar-shaped patch of papillae in disc region C; coloration uniform without dark markings.

Gobiesox punctulatus, stippled clingfish – Flattened papillae in disc region C in 2 widely separated groups; head covered with dark brown dots, 2 transverse white bars crossing the dorsum.

Acyrtops rubiginosus, red clingfish – Flattened papillae in disc region C in 2 closely approximated groups; coloration uniform red or with dark brown transverse bands crossing head and body.

BREGMACEROTIDAE codlets

Bregmaceros atlanticus, antenna codlet – Anal and second dorsal fins bilobed with a deep concave margin; first dorsal fin a single filamentous ray.


GOBIESOCIDAE




Tomiodon fasciatus




Acyrtops beryllinus



Rimicola brevis




Gobiesox punctulatus



Acyrtus rubiginosus



BREGMACEROTIDAE



Bregmaceros atlanticus