

Tablas y gráficos

Tabla 1. Severidad de la DE según grupo de edades.

\* Prueba de Chi cuadrado.

Tabla 2. Distribución de pacientes con hábitos tóxicos, según grado de severidad de la DE.

Variables	Severidad de la DE								Valor p *
	Ligera		Moderada		Severa		Total		
	n (60)	% (16)	n (173)	% (45)	n (152)	% (39)	n (385)	% (100)	
<b>Hábito fumar (n=385)</b>									
Fumador activo	10	10,9	44	47,8	38	41,3	92	23,8	0,048
Exfumador	5	10,0	21	42,0	24	48,0	50	12,9	
Nuca fumó	45	18,5	108	44,4	90	37,1	243	63,3	
<b>Consumo de alcohol (n=385)</b>									
Dependiente alcohólico-bebedor de riesgo	5	11,6	19	44,2	19	44,2	43	11,1	0,170
Bebedor social	37	13,8	127	47,4	104	38,8	268	69,9	

Abstemio	18	24,3	27	36,5	29	39,2	74	19,0	
----------	----	------	----	------	----	------	----	------	--

\* Prueba de Chi cuadrado.

Tabla 4. Valores promedios de variables antropométricas, bioquímicas y hormonales.

Variables	(n=385)				
	Media	DS (±)	Mínimo	Máximo	Rango
<b>Antropométricas</b>					
IMC	26,8	4,01	19	44,94	28,94
Circunferencia de la cintura	98,52	11,57	71	159	98
Índice C/Cd	1,02	0,30	0,87	1,22	0,35
<b>Bioquímicas</b>					
Glucemia	7,60	2,94	3,10	21	17,9
Colesterol total	4,97	1,34	1,62	14,25	12,63
Triglicérido	2,04	1,26	0,69	12,64	11,95
<b>Hormonales</b>					
Testosterona	9,35	5,82	1,21	39,90	38,69
FSH	7,52	4,15	1,50	36,46	34,96
LH	6,36	3,20	0,99	27,20	26,21

**Personas con disfunción eréctil atendidos en la consulta de Andrología, Instituto de Endocrinología de Cuba, 2009-2012**

**Tabla 5: Distribución de pacientes según severidad de la DE y niveles de testosterona sérica total.**

Variable	Severidad de la DE (n=385)						Valor p *
	Ligera		Moderada		Severa		
	n	%	n	%	n	%	
<b>Testosterona disminuida (n=298)</b>	37	61,7	136	78,6	125	82,2	0,005
<b>Testosterona normal (n=87)</b>	23	38,3	37	21,4	27	17,8	
<b>Total</b>	60	100	173	100	152	100	

\* Prueba de Chi cuadrado.

**Tabla 7: Distribución de pacientes según tipo de enfermedad crónica y el grado de severidad de la DE.**


ECNT	Severidad de la DE (n=367)						Valor p *
	Ligera		Moderada		Severa		
	n	%	n	%	n	%	
<b>DM-1</b> (n=20)	4	20,0	11	55,0	5	25,0	0,067
<b>DM-2</b> (n=310)	50	16,2	139	44,8	121	39,0	0,004
<b>HTA</b> (n=228)	30	13,2	98	43,0	100	43,8	0,007
<b>CI</b> (n=96)	14	14,6	34	35,4	48	50,0	0,004
<b>Obesidad</b> (n=81)	13	16,0	31	38,3	37	45,7	0,005
<b>E. Peyronie</b> (n=83)	15	18,1	29	34,9	39	47,0	0,017
<b>HPB</b> (n=11)	1	9,1	4	36,4	6	54,5	0,071
<b>EAP</b> (n=10)	-	-	4	40,0	6	60,0	0,213
<b>ECV</b> (n=7)	-	-	4	57,1	3	42,9	0,062
<b>Otros APP</b> (n=93)	15		43	46,2	35	37,7	0,081

antecedentes patológicos personales. **LEYENDA:** DM1-diabetes mellitus tipo 1; DM 2-Diabetes mellitus tipo 2; HTA-hipertensión arterial; CI-cardiopatía isquémica; HPB-hipertrofia prostática benigna; EAP- enfermedad arterial periférica; ECV- **LEYENDA:** DM1-diabetes mellitus tipo 1; DM 2- Diabetes mellitus tipo 2; HTA-hipertensión arterial; CI-

**Personas con disfunción eréctil atendidos en la consulta de Andrología, Instituto de Endocrinología de Cuba, 2009-2012**


cardiopatía isquémica; HPB- hipertrofia prostática benigna; EAP- enfermedad arterial periférica; ECV- enfermedad cerebrovascular; APP-

**Gráfico 1: Pacientes según padecimiento de enfermedades crónicas.(n= 367)**




**LEYENDA:** DM 2- Diabetes mellitus tipo 2; HTA-hipertensión arterial; CI-cardiopatía isquémica; EP- enfermedad de Peyronie; Ob-obesidad; DM1-diabetes mellitus tipo 1; HPB- hipertrofia prostática benigna; EAP- enfermedad arterial periférica; ECV- enfermedad cerebrovascular; APP- antecedentes patológicos personales.

**Gráfico 2: Distribución según presencia o no de enfermedades crónicas y grado de severidad de la DE. (n=385)**



\* Prueba de Chi cuadrado.

**Gráfico 3: Valores promedio de las variables bioquímicas y hormonales según severidad de la DE. (n=385)**



**LEYENDA:** TG- triglicéridos; Test total-testosterona total; LH-hormona leutinizante; FSH-hormona foliculoestimulante

\*ANOVA