



Quadro 3
Diagnósticos de Enfermagem para cada evidência encontrada nos estudos.

Nº	Principais evidências dos estudos	Diagnósticos de Enfermagem (NANDA 2018-2020) ¹²
1 ²⁰	* O diagnóstico tardio do HIV acontece na contramão do serviço de saúde. * Há invisibilidade da sexualidade do idoso. * Há fragilidades na solicitação da sorologia anti-HIV para os idosos.	-Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado às informações insuficientes - (00126) -Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004) -Comunicação verbal prejudicada caracterizada por dificuldade para falar relacionada a estímulos insuficientes e incongruência cultural (00051)
2 ²¹	* Evidenciou-se baixo nível de conhecimento sobre Sexualidade.	-Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado às informações insuficientes (00126) -Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004) -Comunicação verbal prejudicada caracterizada por dificuldade para falar relacionada a estímulos insuficientes e incongruência cultural (00051)
3 ²³	* Observa-se grande resistência dos idosos quanto ao uso do preservativo. * Nenhum participante relatou diálogo com os profissionais de saúde sobre sua sexualidade durante as consultas.	-Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado às informações insuficientes (00126) -Comportamento de saúde propenso a risco caracterizado por falha em agir de forma a prevenir problemas de saúde relacionado a compreensão inadequada (00188) -Comunicação verbal prejudicada caracterizada por dificuldade para falar relacionada a estímulos insuficientes e incongruência cultural (00051) -Manutenção ineficaz da saúde caracterizada por ausência de interesse em melhorar comportamentos de saúde e padrão de ausência de comportamento de busca de saúde relacionada a habilidades de comunicação ineficazes (00099) -Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004) -Autonegligência caracterizada por falta de adesão a atividades de saúde relacionada a escolha do estilo de vida (00193)
4 ²⁴	* As mudanças na sexualidade conjugal em virtude do processo demencial do idoso advêm de dificuldades na manutenção da higiene, autoestima alterada e hipersexualidade * Identificou-se a necessidade de uma abordagem	-Déficit no autocuidado para banho caracterizado por capacidade prejudicada de acessar a fonte de água, acessar o banheiro, lavar o corpo, pegar os artigos para o banho, regular a água do banho e secar o corpo relacionado a fraqueza e motivação diminuída (00108) -Déficit no autocuidado para higiene íntima caracterizado por capacidade prejudicada de chegar ao vaso sanitário, de dar descarga no vaso sanitário, de manipular as roupas para



Nº	Principais evidências dos estudos	Diagnósticos de Enfermagem (NANDA 2018-2020) ¹²
	profissional sobre a sexualidade conjugal e o cuidado ao idoso em processo demencial	<p>realizar a higiene íntima e de realizar a higiene íntima relacionado a fraqueza, mobilidade prejudicada e motivação diminuída (00110)</p> <p>Conforto prejudicado caracterizado por desconforto com a situação e descontentamento com a situação relacionado ao controle situacional insuficiente (00214)</p> <p>-Autonegligéncia caracterizada por higiene pessoal insuficiente relacionada a função executiva deficiente (00193)</p> <p>-Tensão do papel de cuidador caracterizada por falta de tempo para atender às necessidades pessoais, frustração e indecisão emocional relacionados a condição de saúde instável, condições físicas, energia insuficiente, padrão de relacionamentos ineficazes e excesso de atividades de cuidado (00061)</p> <p>-Comunicação verbal prejudicada caracterizada por dificuldade para falar relacionada a estímulos insuficientes e incongruência cultural (00051)</p> <p>-Relacionamento ineficaz caracterizado por apoio mútuo insuficiente nas atividades cotidianas entre os parceiros e equilíbrio insuficiente na colaboração entre os parceiros relacionados a estressores (00223)</p> <p>-Sobrecarga de estresse caracterizada por aumento da impaciência, estresse excessivo, sentir-se pressionado e tensão relacionado a estressores repetidos (00177)</p> <p>-Padrão de sexualidade ineficaz caracterizado por alteração no comportamento sexual, alteração no relacionamento com pessoa significativa, dificuldade com atividade sexual e dificuldade com comportamento sexual relacionado ao conhecimento insuficiente sobre alternativas relacionadas à sexualidade e relacionamento prejudicado com uma pessoa significativa (00065)</p> <p>-Risco de solidão relacionado a privação afetiva e privação emocional (00054)</p> <p>-Risco de síndrome do idoso frágil relacionado a ansiedade, conhecimento insuficiente sobre os fatores modificáveis, equilíbrio prejudicado e tristeza (00231)</p> <p>-Risco de violência direcionada a si mesmo relacionado a conflito em relação(ões) interpessoal(is) (00140)</p> <p>-Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004)</p> <p>-Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado às informações insuficientes (00126)</p> <p>-Comunicação verbal prejudicada caracterizada por dificuldade para falar relacionada a estímulos insuficientes e incongruência cultural (00051)</p>
5 ³¹	<p>* A maioria dos participantes considerou importante ou levemente importante a realização de triagem para detectar disfunções sexuais</p> <p>* A sexualidade é discutida com menos frequência em pacientes com Doença de Parkinson do sexo feminino e com pacientes com a mesma doença</p>	<p>* A maioria dos participantes considerou importante ou levemente importante a realização de triagem para detectar disfunções sexuais</p> <p>* A sexualidade é discutida com menos frequência em pacientes com Doença de Parkinson do sexo feminino e com pacientes com a mesma doença</p>



Nº	Principais evidências dos estudos	Diagnósticos de Enfermagem (NANDA 2018-2020) ¹²
6 ³²	* Baixa taxa de testagem para detecção de IST * Entre os homens, as taxas mais baixas foram associadas à idade avançada e menor nível educacional * Para as mulheres, foram encontradas taxas mais baixas entre as que não usaram preservativo em seu encontro sexual mais recente	- Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado às informações insuficientes (00126) - Comportamento de saúde propenso a risco caracterizado por falha em agir de forma a prevenir problemas de saúde relacionado a compreensão inadequada (00188) - Manutenção ineficaz da saúde caracterizada por ausência de interesse em melhorar comportamentos de saúde e padrão de ausência de comportamento de busca de saúde relacionada a habilidades de comunicação ineficazes (00099) - Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004) - Autonegligência caracterizada por falta de adesão a atividades de saúde relacionada a escolha do estilo de vida (00193)
7 ³³	* Observa-se resistência ao uso do preservativo pela população idosa * Os idosos se constituem como grupos populacionais mais vulneráveis à infecção pelo HIV e não se reconheceram nesse cenário	- Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004) - Comportamento de saúde propenso a risco caracterizado por falha em agir de forma a prevenir problemas de saúde relacionado a compreensão inadequada (00188) - Autonegligência caracterizada por falta de adesão a atividades de saúde relacionada a escolha do estilo de vida (00193) - Manutenção ineficaz da saúde caracterizada por ausência de interesse em melhorar comportamentos de saúde e padrão de ausência de comportamento de busca de saúde relacionada a habilidades de comunicação ineficazes (00099) - Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado às informações insuficientes (00126)
8 ³³	* 32,8% dos homens com idade superior a 60 anos relataram disfunção sexual	- Risco de baixa autoestima situacional relacionado a alteração da imagem corporal (00153) - Distúrbio na imagem corporal caracterizado pela alteração na função corporal, alteração na visão do próprio corpo, medo da reação dos outros, mudança no envolvimento social, sentimento negativo em relação ao corpo, e Trauma em relação a não funcionamento de parte do corpo relacionado a alteração na autopercepção (00118) - Padrão de sexualidade ineficaz caracterizado por alteração no comportamento sexual e dificuldade com comportamento sexual relacionado ao conhecimento insuficiente sobre alternativas relacionadas à sexualidade e déficit de habilidades sobre alternativas relacionadas à sexualidade (00065)



Nº	Principais evidências dos estudos	Diagnósticos de Enfermagem (NANDA 2018-2020) ¹²
9 ²⁶	* 73,81% dos entrevistados relataram dificuldades em falar sobre sexo * 90,48% dos entrevistados reconhecem a importância do sexo com o nível de felicidade * 84,92% dos entrevistados não usam preservativos durante as relações sexuais	-Risco de resiliência prejudicada relacionado a vulnerabilidade percebida (00211) -Risco de automutilação relacionado a alteração da imagem corporal, autoestima prejudicada, sentimento negativo e sentir-se ameaçado com a perda de relacionamento significativo (00139) -Comunicação verbal prejudicada caracterizada por dificuldade para falar relacionada a estímulos insuficientes e incongruência cultural (00051) -Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004) -Comportamento de saúde propenso a risco caracterizado por falha em agir de forma a prevenir problemas de saúde relacionado a compreensão inadequada (00188) -Autonegligência caracterizada por falta de adesão a atividades de saúde relacionada a escolha do estilo de vida (00193) -Manutenção ineficaz da saúde caracterizada por ausência de interesse em melhorar comportamentos de saúde e padrão de ausência de comportamento de busca de saúde relacionada a habilidades de comunicação ineficazes (00099)
10 ³⁴	* Os participantes mantêm relações sexuais sem prevenção, mas não acreditam que este seja um comportamento de risco * Os homens são menos favoráveis à prevenção do que as mulheres, chegando a enfatizar que isto, na idade deles é desnecessário e inútil. * 68,8% afirmam que conversam sobre sexo	-Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004) -Comportamento de saúde propenso a risco caracterizado por falha em agir de forma a prevenir problemas de saúde relacionado a compreensão inadequada (00188) -Autonegligência caracterizada por falta de adesão a atividades de saúde relacionada a escolha do estilo de vida (00193) -Manutenção ineficaz da saúde caracterizada por ausência de interesse em melhorar comportamentos de saúde e padrão de ausência de comportamento de busca de saúde relacionada a habilidades de comunicação ineficazes (00099) -Disposição para conhecimento melhorado caracterizada por expressa desejo de melhorar a aprendizagem (00161) -Disposição para comunicação melhorada caracterizada por expressa desejo de melhorar a comunicação
11 ²⁷	* Os participantes possuem poucas informações sobre a sexualidade * Sobressaliente da cultura machista, que prega a valorização da sexualidade relacionada ao aspecto físico, de demonstração de força e de virilidade como	-Padrão de sexualidade ineficaz caracterizado por alteração no comportamento sexual e dificuldade com comportamento sexual relacionado ao conhecimento insuficiente sobre alternativas relacionadas à sexualidade e déficit de habilidades sobre alternativas relacionadas à sexualidade (00065) -Comunicação verbal prejudicada caracterizada por dificuldade para falar relacionada a



Nº	Principais evidências dos estudos	Diagnósticos de Enfermagem (NANDA 2018-2020) ¹²
	um dos fatores que interferem na sexualidade	<p>estímulos insuficientes e incongruência cultural (00051)</p> <p>-Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado a informações insuficientes (00126)</p> <p>Risco de dignidade humana comprometida relacionado a compreensão insuficiente das informações de saúde, estigmatização e incongruência cultural (00174)</p> <p>Risco de distúrbio na identidade pessoal relacionado a alteração no papel social, baixa autoestima e incongruência cultural (00225)</p> <p>Risco de baixa autoestima situacional relacionado a alteração da imagem corporal e alteração no papel social (00153)</p> <p>Risco de automutilação relacionado a alteração da imagem corporal, autoestima prejudicada e sentimento negativo (00139)</p>
12 ²⁸	* 60% dos participantes acreditam que a masturbação em excesso pode causar o aparecimento de confusão mental e de demência em pessoas com mais de 65 anos.	<p>-Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado a informações insuficientes (00126)</p> <p>-Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado a informações insuficientes (00126)</p> <p>Risco de dignidade humana comprometida relacionado a compreensão insuficiente das informações de saúde, estigmatização e incongruência cultural (00174)</p> <p>Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004)</p> <p>Comportamento de saúde propenso a risco caracterizado por falha em agir de forma a prevenir problemas de saúde relacionado a compreensão inadequada (00188)</p> <p>-Autonegligência caracterizada por falta de adesão a atividades de saúde relacionada a escolha do estilo de vida (00193)</p> <p>Manutenção ineficaz da saúde caracterizada por ausência de interesse em melhorar comportamentos de saúde e padrão de ausência de comportamento de busca de saúde relacionada a habilidades de comunicação ineficazes (00099)</p>
13 ²⁹	* A maioria dos participantes alega ser sexualmente ativo e conhece os meios de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis, mas poucos o utilizam. * Há prevalência no discurso de que a AIDS está associada a “grupos de risco” e de comportamento tido como imoral.	<p>-Conhecimento deficiente caracterizado por conhecimento insuficiente relacionado a informações insuficientes (00126)</p> <p>Risco de infecção relacionado ao conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos (00004)</p>
14 ³⁰	* O nível de conhecimento, atitude e prática dos participantes sobre sexualidade ainda é deficitário	