



Agronomía Mesoamericana
ISSN: 2215-3608
pccmca@gmail.com
Universidad de Costa Rica
Costa Rica

Composición nutricional del *Tripsacum laxum* fertilizado con nitrógeno, fósforo y potasio ¹

Boschini-Figueroa, Carlos; Vargas-Rodríguez, Claudio Fabián

Composición nutricional del *Tripsacum laxum* fertilizado con nitrógeno, fósforo y potasio ¹

Agronomía Mesoamericana, vol. 29, núm. 1, 2018

Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43754020012>

DOI: <https://doi.org/10.15517/ma.v29i1.27293>

© 2018 Agronomía Mesoamericana es desarrollada en la Universidad de Costa Rica

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Composición nutricional del *Tripsacum laxum* fertilizado con nitrógeno, fósforo y potasio ¹

Nutritional composition of *Tripsacum laxum* fertilized with nitrogen, phosphorous and potassium

Carlos Boschini-Figueroa
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
carlos.boschini@ucr.ac.cr

DOI: <https://doi.org/10.15517/ma.v29i1.27293>
Redalyc: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43754020012>

Claudio Fabián Vargas-Rodríguez
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
fabian.vargas@ucr.ac.cr

Recepción: 22 Febrero 2017
Aprobación: 03 Abril 2017

RESUMEN:

El conocimiento de las prácticas culturales que permiten obtener el mayor beneficio del potencial de las fuentes forrajeras es necesario para el éxito en la producción animal. El objetivo de este estudio fue explorar la respuesta bromatológica del *Tripsacum laxum* a la fertilización con diferentes niveles de nitrógeno, fósforo y potasio aplicado al suelo. La investigación se realizó en la Estación Experimental de Ganado Lechero “Alfredo Volio Mata” de la Universidad de Costa Rica, localizada en Ochomogo, Cartago, Costa Rica. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y los tratamientos dispuestos en un arreglo factorial de compuesto central y rotable 53. La materia seca (MS), proteína cruda (PC), fibra neutro detergente (FND) y el extracto etéreo (EE) fueron determinados. Dependiendo de los niveles de fertilización con N, P y K se obtuvieron las dosis apropiadas para lograr contenidos de nutrientes máximos en cada uno de los parámetros bromatológicos evaluados en este estudio, y fue posible optimizar la composición de la mezcla fertilizante según el componente nutricional que se quiera privilegiar en particular ya sea en la hoja, en el tallo o en la planta entera. No existe una dosis de fertilizante única para mejorar todos los componentes nutricionales de la planta.

PALABRAS CLAVE: forrajes, relaciones planta suelo, respuesta de la planta, plantas forrajeras.

ABSTRACT:

Getting to know the knowledge that cultural practices have allows researchers to obtain the greatest benefit from the potential of fodder sources, this knowledge is necessary for animal production success. The aim of this study was to explore the bromatological response of *Tripsacum laxum* to fertilization with different levels of nitrogen, phosphorus, and potassium that were applied to the ground. The investigation was conducted at the “Alfredo Volio Mata” Experimental Dairy Farm a Dairy farm that is part of the University of Costa Rica and that is located in Ochomogo, Cartago, Costa Rica. In the investigation a randomized block design with four replications and treatments arranged in a factorial central composite and on a rotatable 53 was used. Dry matter, crude protein, neutral detergent fiber, and ether extract were determined. Depending on the levels of fertilization with N, P, and K, the appropriate doses were obtained in order to reach the maximum nutrient contents in each of the bromatological parameters evaluated in this study, it was possible to optimize the composition of the fertilizer mixture based on the nutritional component to be particularly favored, either on the leaf, on the stem, or on the whole plant. No single fertilizer dose was able to improve all nutritional components of the plant.

KEYWORDS: forage, plant soil relation, plant response, feed crops.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de explotaciones ganaderas ha generado una alta demanda de materiales forrajeros de buena calidad (Suyama et al., 2007), esto ha ocasionado que los productores se vean obligados a utilizar una serie de insumos que suplan a los pastos la cantidad de nutrientes necesarios para soportar un manejo intensivo de cosecha (Cherney et al., 1994). Sin embargo, los cultivos forrajeros han sido los que menos atención han recibido en materia de fertilización o se han sostenido bajo esquemas muy pobres que no suplen por completo las necesidades de producción (Cástino, 2007).

La mayoría de las fórmulas químicas se enfocan en fuentes nitrogenadas fosfóricas y potásicas, debido a que, son los elementos que más limitan el crecimiento y la composición nutricional de los forrajes en general (Torres y Lemos, 2009). El fósforo cuando es deficiente reduce la expansión foliar, lo cual ocasiona un amarillamiento y senescencia prematura de las hojas maduras, el crecimiento aéreo se reduce y ocasiona que una mayor proporción de nutrientes disponibles en la planta se destine al desarrollo radicular, lo que provoca una subutilización de recursos que se traduce en producciones pobres de forraje (Quintero et al., 1997). Forma parte de los compuestos orgánicos ricos en energía y es indispensable en procesos como la síntesis de proteínas, grasas y almidones en las plantas (Romero y Márquez, 2002; Mehrvarz y Chaichi, 2008).

La carencia de nitrógeno afecta la acción fotosintética, debido a una reducción en la capacidad de uso del carbono. Esto implica una merma en la actividad metabólica de los cloroplastos y por consiguiente, una menor presencia de nitrógeno en los tejidos de asimilación (Veneciano y Frigerio, 2008).

El potasio está muy relacionado con la capacidad de intercambio de cationes, su deficiencia altera la disponibilidad de otros elementos, además tiene una importante participación en el metabolismo de los ácidos nucleicos, proteínas, vitaminas y las sustancias de crecimiento (Bednarz y Oosterhuis, 1999).

La carencia de los elementos mayores afectan a los forrajes como el pasto Prodigio, Prodigioso o Guatemala (*Tripsacum laxum*), conocido también como *Tripsacum fasciculatum* y *Tripsacum andersonii* (Chen, 1992), que es utilizado bajo sistemas muy intensivos, con frecuencias de cosechas cortas, donde la demanda de los nutrientes es alta y la velocidad de crecimiento está ligada a los elementos que el suelo pueda aportar, limitación que se manifiesta en pobres rendimientos y contenido nutricional (Bertsch, 1998). Este material, ubicado en la misma línea filogenética del teosinte, es un pariente silvestre del maíz (*Zea mays*). El género *Tripsacum* es el único con el cual se ha podido cruzar el maíz en condiciones experimentales y se han producido híbridos viables que crecen hasta alcanzar la madurez (Leblanc et al., 1995).

Actualmente hay muy poca información con respecto al efecto del nitrógeno, fósforo y potasio sobre la calidad del *T. laxum*. Existe entonces la necesidad de implementar programas de fertilización precisos para el cultivo y que no causen daños al ambiente.

Con esa base, se ejecutó el presente trabajo cuyo objetivo fue explorar la respuesta bromatológica del *Tripsacum laxum* a la fertilización con diferentes niveles de nitrógeno, fósforo y potasio aplicado al suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización

El experimento se ejecutó en la Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio Mata de la Universidad de Costa Rica, durante el último trimestre del año 2013. Esta unidad está localizada a 1542 msnm en Ochomogo de Cartago, donde la precipitación media anual es de 1502 mm (concentrada en la época de mayo a noviembre). La humedad relativa media es de 88% y la temperatura promedio anual de 17,9 °C (IMN, 2010). El ecosistema de la zona es considerado como bosque húmedo montano bajo (Vásquez, 1982). El suelo es de origen volcánico, clasificado como "Typic Hapludands", presenta buen drenaje y una fertilidad media (Soil Survey Staff, 2014).

Procedimiento experimental

El área empleada para establecer el cultivo fue de 5000 m² aproximadamente, la cual se sembró con pasto Prodigioso (*Tripsacum laxum*) durante la época lluviosa del 2011. Se utilizó una densidad de siembra de tres tallos de semilla vegetativa, colocadas las partes apical, media y basal en forma de cadena en el surco a una distancia entre hileras de 70 cm. La primera cosecha se realizó 365 días después de la siembra, durante el segundo semestre del 2012. Se recogió una segunda cosecha y se uniformizó en mayo del 2013 para iniciar el experimento. A los quince días de edad, cuando el rebrote alcanzó una altura de 10 cm, se aplicaron los tratamientos de fertilización.

El área de cultivo se dividió en 76 parcelas de 48 m² para distribuir los tratamientos experimentales, se dejó dos metros de separación alrededor de cada una de ellas, dentro de cada uno de los cuatro bloques experimentales. El periodo experimental tuvo una duración de 120 días, desde la uniformización hasta la cosecha. Los niveles de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) centrales fueron: 225 kg de N/ha/año, 60 kg de P₂O₅/ha/año, y 150 kg de K₂O/ha/año, formulándose el diseño de compuesto central con las dosis equivalentes según el diseño factorial rotatable. Las cantidades empleadas fueron dosis equivalentes a 35, 112,5, 225, 337,5 y 414,2 kg/ha/año de nitrógeno (N₂); 9,55, 30, 60, 90 y 110,45 kg/ha/año de fósforo (P₂O₅) y 23,87, 75, 150, 225 y 276,13 kg/ha/año de potasio (K₂O). La mezcla física se distribuyó de manera uniforme en cada parcela. El cultivo fue supervisado cada semana durante todo el periodo experimental, realizándose las labores culturales necesarias (control de malas hierbas, gusanos e insectos radicales y foliares, hongos y taltuzas o roedores) y un seguimiento visual de la evolución del crecimiento (altura, grosor y vigor de la planta).

La cosecha se realizó en cada parcela experimental, se tomaron cuatro muestras de material por tratamiento dentro de cada bloque. Las muestras fueron pesadas en verde y llevadas al laboratorio de bromatología de la estación experimental para la separación en hojas y tallos, así como los análisis químicos respectivos. Ambas fracciones se pesaron por separado y se secaron a 60 °C durante 48 horas hasta alcanzar un peso constante y pesadas nuevamente en seco. El contenido de materia seca (MS) se determinó en cada una de las 152 muestras experimentales, sometiéndolas a 105 °C mediante el procedimiento descrito por el AOAC (2002). A cada una de ellas se le determinó el contenido de extracto etéreo (EE) (AOAC, 2000), proteína cruda (PC) (Sosa-de-Pro, 1979), fibra en detergente neutro (FND), fibra en detergente ácido (FAD) y lignina mediante el procedimiento de Goering y Van-Soest (1970). La celulosa y hemicelulosa se obtuvieron por diferencia (Sosa-de-Pro, 1979).

Diseño experimental

El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con cuatro repeticiones y los tratamientos se dispusieron en un arreglo factorial de compuesto central y rotatable 53 (Cochran y Cox, 1957; Boschini, 2008). El modelo estadístico empleado fue el siguiente [fórmula 1]:

$$Y_{iulw} = R_w + b_o + \sum_{i=1}^k b_i X_{iul} + \sum_{i=1}^k b_{ii} X_{iul}^2 + \sum_{i<j}^k b_{ij} X_{iul} X_{jul} + e_{iulw} \quad [\text{fórmula 1}]$$

donde:

Y_{iulw} = observación l-ésima en w-ésimo bloque en el u-ésimo nivel del i-ésimo factor.

R_w = bloque w-ésimo.

b_o = valor de la intersección en la superficie de respuesta.

b_i = pendiente lineal del i-ésimo factor.

b_{ii} = pendiente cuadrática del i-ésimo factor.

b_{ij} = pendiente de la interacción del i-ésimo factor x el j-ésimo factor.

X_{iul} = observación l-ésima en el nivel u-ésimo del i-ésimo factor.

X_{jul} = observación l-ésima en el nivel u-ésimo del j-ésimo factor.

e_{iulw} = error experimental en la observación l-ésima en el w-ésimo bloque en el u-ésimo nivel del i-ésimo factor.

Los resultados se analizaron con el PROC GLM del paquete estadístico SAS (1985) con el modelo descrito. Se realizó un ANOVA en cada uno de los cinco componentes bromatológicos estudiados, tanto en hojas como en tallos y planta entera, y se determinó los efectos lineales, cuadráticos y cúbicos de cada factor, así como las interacciones de primer orden entre los factores que resultaron significativos. Posteriormente, se escogieron los efectos significativos ($P < 0,01$) y se introdujeron en una regresión polinomial múltiple con

los tres factores (nitrógeno, fósforo y potasio) para cada componente bromatológico, tanto en hojas, tallos como en la planta entera. De cada regresión se extrajo las derivadas parciales correspondientes a cada factor, con el propósito de estimar individualmente el nivel de nitrógeno, fósforo y potasio (kg/ha/año), donde se alcanza una respuesta porcentual mínima o máxima del componente bromatológico al cual se aplica.

RESULTADOS

Al explorar la respuesta bromatológica del *Tripsacum laxum* con diferentes niveles de N, P y K aplicados al suelo, los resultados obtenidos se detallan en en Cuadro 1, tanto en la planta entera como en la parte foliar y el tallo.

CUADRO 1

Descripción de las diferentes combinaciones de nitrógeno, fósforo y potasio (N, P, K) utilizados como tratamientos y los valores de respuesta del contenido de materia seca, proteína cruda, fibra neutro detergente, extracto etéreo y cenizas de las diferentes partes del *Tripsacum laxum*. Estación Experimental Alfredo Volio Mata, Cartago, Costa Rica. 2013.

Tratamientos				Hoja					Tallo					Planta entera				
N (N ₂)	P (P ₂ O ₅)	K (K ₂ O)	n	MS	PC	FND	CEN	EE	MS	PC	FND	CEN	EE	MS	PC	FND	CEN	EE
kg/ha/año				%					%					%				
35,00	60,00	150,00	4	24,16	10,24	73,03	13,05	1,68	11,38	6,88	66,14	13,38	1,11	19,66	8,98	70,44	13,18	1,46
112,50	30,00	75,00	4	23,46	12,43	70,24	11,81	1,80	12,47	7,42	64,51	12,14	1,28	17,37	10,55	68,09	11,93	1,60
112,50	30,00	225,00	4	24,17	10,44	70,76	12,78	1,44	11,74	6,28	67,70	12,99	1,02	17,71	8,88	69,65	12,86	1,28
112,50	90,00	75,00	4	23,86	13,29	71,50	12,68	2,05	10,31	8,19	66,66	14,13	1,26	16,13	11,37	69,68	13,23	1,75
112,50	90,00	225,00	4	23,09	12,24	71,87	11,98	2,35	11,26	8,55	66,71	13,71	1,60	15,75	10,85	69,24	12,63	2,07
225,00	9,55	150,00	4	23,27	13,43	69,92	11,95	2,14	12,09	7,79	63,76	12,51	1,55	15,36	11,31	67,61	12,16	1,92
225,00	60,00	23,87	4	23,24	10,94	69,85	14,06	1,69	11,52	7,14	66,27	13,63	1,22	16,98	9,51	69,77	13,90	1,51
225,00	60,00	150,00	20	23,68	12,28	71,14	13,37	2,27	11,86	8,22	64,40	13,74	1,55	16,70	10,75	68,61	13,51	2,00
225,00	60,00	276,13	4	23,51	12,02	72,28	13,70	2,06	10,94	8,44	69,26	14,64	1,40	16,23	10,67	71,15	14,05	1,81
225,00	110,45	150,00	4	24,64	11,47	71,97	12,58	2,00	12,71	7,75	65,46	12,24	1,46	17,22	10,08	69,53	12,45	1,79
337,50	30,00	75,00	4	21,54	13,91	71,63	13,90	1,95	12,94	10,00	66,68	14,13	1,50	12,83	12,44	69,77	13,98	1,78
337,50	30,00	225,00	4	23,13	14,07	71,11	12,30	2,31	11,46	11,01	63,20	12,51	1,63	16,51	12,92	68,14	12,38	2,06
337,50	90,00	75,00	4	22,81	15,83	70,22	13,03	2,54	12,18	10,30	63,80	14,35	1,83	17,01	13,75	67,81	13,52	2,28
337,50	90,00	225,00	4	22,98	11,97	69,15	13,62	1,89	12,98	10,39	66,38	14,12	1,68	17,16	11,37	68,11	13,81	1,81
414,20	60,00	150,00	4	24,64	13,32	70,82	12,45	1,98	12,15	9,48	63,02	12,36	1,59	17,38	11,87	67,29	12,42	1,84

MS: materia seca, PC: proteína cruda, FND: fibra neutro detergente, CEN: cenizas totales, EE: extracto etéreo, como % / MS: dry matter, PC: crude protein, FND: neutral detergent fiber, CEN: total ashes, EE: ether extract, as a %.

Table 1. Description of the different nitrogen, phosphorus, and potassium (N, P, K) combinations used as treatments and the obtained response values of dry matter content, crude protein, neutral detergent fiber, ether extract, and ash from the different parts of the *Tripsacum laxum*. Alfredo Volio Mata Experimental Farm. Cartago, Costa Rica. 2013.

El contenido máximo de materia seca (MS) en planta entera de *Tripsacum laxum* obtenido fue de 15,85%, cuando se aplicó una dosis de nitrógeno (N) de 265,64 kg/ha/año (Cuadro 2). Al fraccionar el pasto en hojas y tallo, se observó que una aplicación equivalente al 54% del nitrógeno usado para la máxima producción en la planta entera (145 kg/ha/año), permitió alcanzar los contenidos más altos de materia seca en tallos (11,09%), y con 110 kg/ha (equivalente al 41%) se alcanzó el máximo contenido de materia seca (24,06%) en hojas.

CUADRO 2

Valores de nitrógeno, fósforo y potasio (N, P, K) que produjeron los contenidos máximos de materia seca, proteína cruda, fibra en detergente neutro, extracto etéreo y cenizas en el forraje *Tripsacum laxum*. Estación Experimental Alfredo Volio Mata, Cartago, Costa Rica. 2013.

Ítems bromatológicos por factor		Dosis máxima, kg/ha	Contenido máximo, %
Nitrógeno			
Materia seca	Hoja	110,47	24,06
	Tallo	145,19	11,09
	Entera	265,64	15,85
Proteína cruda	Hoja	398,84	13,51
	Tallo		Lineal
	Entera		Lineal
Fibra en detergente neutro	Hoja	304,48	70,51
	Tallo	81,00	66,22
	Entera		Lineal
Extracto etéreo	Hoja	275,45	2,17
	Tallo	389,58	1,62
	Entera	301,86	1,94
Cenizas	Hoja	100,17	12,47
	Tallo	93,29	13,12
	Entera	99,24	12,72
Fósforo			
Materia seca	Hoja	17,51	23,32
	Tallo	26,97	12,19
	Entera	9,53	15,42
Proteína cruda	Hoja	22,14	12,56
	Tallo	32,68	8,21
	Entera	23,75	10,82
Fibra en detergente neutro	Hoja	19,99	70,70
	Tallo	18,28	64,55
	Entera	21,97	68,60
Extracto etéreo	Hoja	27,21	1,90
	Tallo	27,40	1,37
	Entera	27,14	1,70
Cenizas	Hoja	66,71	13,23
	Tallo	31,25	12,81
	Entera	64,83	13,46
Potasio			
Materia seca	Hoja	93,97	23,28
	Tallo	131,83	12,12
	Entera	66,05	16,16
Proteína cruda	Hoja	68,26	13,18
	Tallo	53,77	8,11
	Entera	65,97	11,32
Fibra en detergente neutro	Hoja	48,33	70,62
	Tallo	126,09	64,40
	Entera	134,60	68,31
Extracto etéreo	Hoja	60,27	2,01
	Tallo	77,63	1,45
	Entera	61,42	1,78
Cenizas	Hoja	15,94	14,45
	Tallo	64,75	13,75
	Entera	149,97	12,85

Table 2. Values of nitrogen, phosphorus and potassium (N, P, K) that produced the maximum content of dry matter, crude protein, neutral detergent fiber, ether extract, and ash in the forage *Tripsacum laxum*. Alfredo Volio Mata Experimental Farm. Cartago, Costa Rica. 2013.

El contenido de proteína cruda mostró un incremento lineal en la planta entera conforme se aportó mayor cantidad de nitrógeno; por su parte, las hojas alcanzaron un contenido máximo de 13,5% cuando la dosis de nitrógeno aplicado llegó a 399 kg N/ha/año. Las ecuaciones que predicen el comportamiento bromatológico de la planta entera y fraccionada se detallan en el Cuadro 3.

CUADRO 3

Predicción de calidad nutricional dependiendo de los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio (N, P, K) aplicados al *Tripsacum laxum*. Estación Experimental Alfredo Volio Mata, Cartago. 2013.

Ítems bromatológicos por factor		Ecuación de regresión		
Nitrógeno				
Materia seca	Hoja	Y = 23,60450973+0,01631311*N-0,00013819*N ² +0,00000025*N ³		R ² =0,71
	Tallo	Y = 11,15779642-0,00705253*N+0,00005866*N ² -0,00000009*N ³		R ² =0,98
	Entera	Y = 20,53811998-0,03531959*N+0,00006648*N ²		R ² =0,92
Proteína cruda	Hoja	Y = 9,792602363+0,018640165*N-0,000023368*N ²		R ² =0,87
	Tallo	Y = 6,612060879+0,00832565*N		R ² =0,81
	Entera	Y = 9,050704505+0,008198254*N		R ² =0,82
Fibra en detergente neutro	Hoja	Y = 73,39005553-0,01892624*N+0,00003108*N ²		R ² =0,86
	Tallo	Y = 66,04716803+0,00433047*N-0,00002673*N ²		R ² =0,91
	Entera	Y = 70,44072516-0,00697707*N		R ² =0,90
Extracto etéreo	Hoja	Y = 1,505752173+0,004808827*N-0,000008729*N ²		R ² =0,98
	Tallo	Y = 0,9907247899+0,0032241463*N-0,000004138*N ²		R ² =0,98
	Entera	Y = 1,305909753+0,004208537*N-0,000006971*N ²		R ² =0,98
Cenizas	Hoja	Y = 13,69642449-0,02505912*N+0,00015246*N ² -0,00000024*N ³		R ² =0,88
	Tallo	Y = 13,92232255-0,01853234*N+0,00012658*N ² -0,00000022*N ³		R ² =0,94
	Entera	Y = 13,78942467-0,02266308*N+0,00014257*N ² -0,00000023*N ³		R ² =0,98
Fósforo				
Materia seca	Hoja	Y = 22,77811735+0,0477393*P-0,00107856*P ² +0,00000714*P ³		R ² =0,69
	Tallo	Y = 11,78429835+0,04254162*P-0,00124817*P ² +0,0000085*P ³		R ² =0,99
	Entera	Y = 15,04588576+0,04185126*P-0,00022076*P ²		R ² =0,81
Proteína cruda	Hoja	Y = 14,9351456-0,17083825*P+0,00327335*P ² -0,00001809*P ³		R ² =0,73
	Tallo	Y = 8,08136317-0,019628261*P+0,000953157*P ² -0,00000713*P ³		R ² =0,42
	Entera	Y = 12,357138861-0,11361387*P+0,00239025*P ² -0,00001389*P ³		R ² =0,54
Fibra en detergente neutro	Hoja	Y = 68,63721277+0,15250704*P-0,00276787*P ² +0,00001498*P ³		R ² =0,94
	Tallo	Y = 62,93474645+0,11405182*P-0,00153207*P ² +0,00000649*P ³		R ² =0,81
	Entera	Y = 66,35831998+0,15325071*P-0,00263012*P ² +0,000013359*P ³		R ² =0,99
Extracto etéreo	Hoja	Y = 2,417102995-0,03680836*P+0,000772012*P ² -0,000004288*P ³		R ² =0,97
	Tallo	Y = 1,762984541-0,027068911*P+0,000537556*P ² -0,000002872*P ³		R ² =0,99
	Entera	Y = 2,176674893-0,033567796*P+0,000694069*P ² -0,000003822*P ³		R ² =0,99
Cenizas	Hoja	Y = 11,51230862+0,05146131*P-0,00038569*P ²		R ² =0,94
	Tallo	Y = 12,84340135-0,04495246*P+0,00181752*P ² -0,00001318*P ³		R ² =0,95
	Entera	Y = 11,56985705+0,05832499*P-0,00044984*P ²		R ² =0,96
Potasio				
Materia seca	Hoja	Y = 23,18032966-0,00336534*K+0,00006335*K ² -0,00000017*K ³		R ² =0,33
	Tallo	Y = 11,20973313+0,01382869*K-0,00005245*K ²		R ² =0,91
	Entera	Y = 17,7838801-0,04687854*K+0,00039796*K ² -0,0000009*K ³		R ² =0,70
Proteína cruda	Hoja	Y = 9,031630991+0,105231743*K-0,000755049*K ² +0,000001505*K ³		R ² =0,73
	Tallo	Y = 6,415352117+0,043897433*K-0,000255856*K ² +0,000000456*K ³		R ² =0,56
	Entera	Y = 8,044945999+0,082249907*K-0,000567003*K ² +0,000001108*K ³		R ² =0,65
Fibra en detergente neutro	Hoja	Y = 68,50068029+0,06434424*K-0,00047525*K ² +0,00000105*K ³		R ² =0,95
	Tallo	Y = 67,65724831-0,05158923*K+0,00020458*K ²		R ² =0,96
	Entera	Y = 70,62403106-0,0344007*K+0,00012779*K ²		R ² =0,88
Extracto etéreo	Hoja	Y = 1,357048638+0,016310763*K-0,0001035542*K ² +0,000000194*K ³		R ² =0,99
	Tallo	Y = 1,065317228+0,00779258*K-0,000041086*K ² +0,000000063*K ³		R ² =0,95
	Entera	Y = 1,2396431+0,013312359*K-0,000081574*K ² +0,000000148*K ³		R ² =0,99
Cenizas	Hoja	Y = 14,4678132-0,002320152*K+0,00007278*K ²		R ² =0,79
	Tallo	Y = 13,29042002+0,01883305*K-0,0002256*K ² +0,00000062*K ³		R ² =0,99
	Entera	Y = 14,35159641-0,02004836*K+0,00006684*K ²		R ² =0,84

Table 3. Prediction of nutritional quality depending on the different applied levels of nitrogen, phosphorus, and potassium (N, P, K) to the *Tripsacum laxum*. Alfredo Volio Mata Experimental Farm. Cartago, Costa Rica. 2013.

El porcentaje de fibra en detergente neutro (FND) en la planta entera varió entre 67 y 71% en el conjunto de tratamientos; en hojas, el rango fue de 69 a 73% y, en el tallo, de 63 a 69%. Se observó que al aumentar la aplicación de nitrógeno, la concentración de FND incrementó en la planta entera de manera lineal y en forma cuadrática en tallos y hojas, con un mínimo de 66% en el tallo al aplicarse 81 kg N/ha/año, y un máximo de 70,5% en la hoja al aplicarse 304 kg N/ha/año.

El efecto de la fertilización nitrogenada en el contenido de extracto etéreo (EE) fue cuadrático en la hoja, el tallo y, consecuentemente, en la planta entera. En la hoja la concentración de EE fue de 1,50% sin fertilización nitrogenada, y alcanzó un máximo de 2,17% con la aplicación de 275 kg N/ha/año; en el tallo, se obtuvo un 0,99% de EE con una dosis de 0 kg N/ha/año, y se incrementó a un máximo de 1,66% con 390 kg N/ha/año. Al estimar un valor ponderado conjunto de hojas y tallos, el contenido de EE en la planta entera fue 1,30% cuando el cultivo no recibió fertilización nitrogenada, aumentando la concentración de EE hasta alcanzar un valor pico de 1,94% cuando recibió 302 kg N/ha/año.

El contenido mineral expresado en forma de cenizas totales mostró un valor medio cercano al 13%, observándose concentraciones más altas con cantidades de nitrógeno inferiores a 70 kg/ha/año (13,23% en hojas, 12,81% en tallos, y 13,46% en la planta completa).

Con la adición de fósforo, los contenidos de materia seca más altos se lograron con cantidades pequeñas. La fracción vegetal que requirió más cantidad de ese elemento fueron los tallos que necesitaron 26,97 kg/ha/año para lograr 12,19%; mientras la planta entera y las hojas demandaron el 35 y el 65% de la dosis anterior para alcanzar contenidos de materia seca máximos de 15,42 y 23,32%, respectivamente.

El *Tripsacum laxum* como planta entera mostró niveles de proteína cruda de 10,82% cuando recibió 23,75 kg P/ha/año, en las hojas el contenido fue 12,56% y en tallos de 8,21%, con cantidades de fósforo de 22,14 y 32,68 kg P/ha/año, respectivamente.

Al analizar la fracción fibrosa, la diferencia en la cantidad de fósforo aplicado para alcanzar las proporciones máximas de fibra en detergente neutro variaron en un rango corto; la planta entera demandó 21,97 kg/ha/año, las hojas necesitaron 19,99 kg/ha/año y los tallos 18,28 kg/ha/año; esa diferencia de un kilogramo entre las partes de la planta y la planta entera, generaron valores de fibra en detergente neutro de 68,60%, 70,70% y 64,55%, en el orden antes mencionado. El mismo patrón se observó para extracto etéreo, pero en este caso los máximos rendimientos se lograron con la misma cantidad de fósforo, tanto para planta entera como para sus partes (27 kg P/ha/año).

El contenido máximo de cenizas en hojas y planta entera fue alrededor de 13% con una dosis media de 65 kg P/ha/año, mientras que las cenizas contenidas en el tallo alcanzaron un valor similar con una dosis equivalente al 48% de lo requerido por las hojas.

Las cantidades de fósforo que se necesitaron para obtener la máxima concentración de materia seca, proteína cruda, fibra en detergente neutro y extracto etéreo, tanto en las hojas como en el tallo, estuvieron en un rango de 10 a 33 kg P/ha/año.

La fertilización con potasio (K) mostró que el contenido de materia seca en las hojas alcanzó un valor máximo de 23,28% con una dosis de 93,97 kg K/ha/año, equivalente a un 75% de lo que requirieron los tallos para lograr un contenido pico de 12,12%. No obstante, al observar la reacción de la planta entera a la fertilización potásica, el requerimiento de potasio se dio a un nivel menor que lo demandado por las hojas y tallos por separado. En la planta entera un nivel de potasio requerido para alcanzar un contenido máximo de 16,16% fue de 66,05 kg K/ha/año. Por su parte, la dosis de potasio que se necesitó para generar los mejores resultados de proteína cruda (11,32% para la planta entera, 13,18% en hojas y 8,11% en tallos) no sobrepasaron los 68,26 kg K/ha/año, cantidad muy parecida a la que dio el valor más alto de materia seca en la planta entera.

En la fracción fibrosa en detergente neutro (FND), se observó que una dosis de potasio de 48 kg/ha/años permitió alcanzar un máximo de 70% en las hojas, 126 kg/ha/año para que el tallo mostrara un máximo de 64% y 140 kg/ha/año para que la planta entera tuviera un 68,31% de fibra en detergente neutro; no obstante, estas cantidades exceden en un 250% la dosis que requirieron hojas.

El efecto del potasio sobre la concentración pico del extracto etéreo se manifestó entre 60 a 77 kg K/ha/año, para hoja y tallo, respectivamente; con un valor intermedio para la planta entera. Contrario a esta respuesta, se observaron marcadas diferencias en la cantidad requerida de potasio para alcanzar las máximas concentración de cenizas en hojas y tallos (13-14%).

DISCUSIÓN

La producción de materia seca es el parámetro sobre el cual se centra la composición nutricional de un material, en el caso del *Tripsacum laxum* el valor obtenido fue de 15,85% cuando la dosis de N suministrada fue de 265,64 kg/ha/año. Este dato es ligeramente mayor a los resultados de 15,49% obtenidos en un estudio que evaluó la misma especie a una edad de cosecha de 365 días (Vargas-Rodríguez, 2009). Esto indica que

la fertilización nitrogenada en el pasto Prodigioso favoreció el crecimiento y, que a edades más cortas, se logró un adecuado contenido de MS; sin embargo, resultó contrario a lo expuesto en otros reportes, donde se menciona que conforme aumenta la edad de la planta aumenta el contenido de materia seca (Amador y Boschini, 2000).

Los resultados observados en cuanto a los rendimientos porcentuales de MS en las fracciones del *T. laxum* permiten considerar la regulación de la dosis de nitrógeno de acuerdo con el objetivo que se quiere con un plan de fertilización, y así maximizar la calidad y rentabilidad. Por ejemplo, para maíz se indica que con dosis de 150 kg N/ha/año se logra la producción económica máxima de este cultivo, y con 200 kg N/ha/año aumenta la calidad del mismo cuando se usa para ensilaje (Cox et al., 1993).

El comportamiento lineal observado en el contenido de proteína cruda que mostró el pasto Prodigioso, mostró el efecto que tiene el nitrógeno sobre la estructura de la proteína y la elongación de los tallos (Frink et al., 1999). Esta conducta se asemeja a los datos obtenidos en maíz, donde al evaluar dosis ascendentes de nitrógeno, el contenido proteico se incrementó más del 100% al aplicar 400 kg/ha de nitrógeno (Soto et al., 2004).

Los porcentajes de la fracción fibrosa en el *T. laxum* observados en este estudio fueron muy similares a un reporte previo donde se obtuvieron valores de 68,58% de FND (Vargas-Rodríguez, 2009), pero fueron superiores a otro trabajo realizado con esta misma especie donde el valor de FDN fue de 63,9% (Mlay et al., 2006). Ambos trabajos utilizaron *T. laxum* de edades avanzadas (> 150 días), lo que hace suponer que es un material forrajero que mantiene muy constante los contenidos fibrosos al pasar el tiempo. Al comparar el pasto Prodigioso con otros materiales, los valores de FND obtenidos en este estudio resultaron menores a los valores de 73,36% de FND reportados en el sorgo negro forrajero (*Sorghum almum*) (Vargas-Rodríguez, 2005), cosechado a setenta días de edad y fertilizado con 95 kg N/ha/año. Incluso, fueron valores menores a lo reportado en estrella africana (*Cynodon nlemfluensis*) de 72,3%, a una edad de cosecha de 25 días (Sánchez y Soto, 1999).

En cuanto al efecto de la fertilización nitrogenada en el contenido de EE, el rango de 1,66 a 2,17% obtenidos en las fracciones y la planta entera se encuentran en un nivel aceptable para usarse en la alimentación de vacas lecheras, debido a que contenidos superiores al 5% pueden afectar la digestión de la fibra y el consumo de materia seca (Tobía y Villalobos, 2004).

Cuando se confrontan los resultados de este estudio, en términos del contenido de cenizas, con datos obtenidos en maíz cosechado a una edad parecida (Boschini-Figueroa y Elizondo-Salazar, 2004), los tallos y la planta entera de maíz (6,74% y 8,67%, respectivamente) no superaron los valores que mostró el *T. laxum*; sin embargo, el contenido de EE en las hojas de ambas especies mostraron semejanza (13,63%).

La suplementación adecuada de fósforo evita que aspectos como el desarrollo foliar se vea afectado, la deficiencia de este elemento en maíz ha sido asociada a una disminución en el tamaño de las hojas y el área foliar, ocasionado por una reducción en la división celular (Assuero et al., 2004). Los resultados en *T. laxum* indican que, incrementos significativos en el contenido de materia seca se pueden alcanzar con pequeñas dosis del elemento P. Al comparar la concentración de proteína cruda del Prodigioso utilizado en este estudio, con información perteneciente a materiales del mismo género, pero de diferente especie como el *Tripsacum dactyloides*, se observó que, el contenido proteico de las hojas es inferior, mientras que en los tallos son muy similares según lo reportado en un trabajo donde se observó que el *T. dactyloides* mostró 18,6% de proteína cruda en hojas y 8,2% en tallos (Bidlack et al., 1999). Sin embargo, los datos de planta entera resultaron ligeramente superiores al 9,1% de proteína cruda que se menciona en otro trabajo también realizado con *T. dactyloides* (Horner et al., 1985).

En relación a la fracción fibrosa, el material experimental presentó una producción de fibra alta cuando la dosis de P aplicada estuvo entre 18 y 20 kg/ha/año, cantidades que fueron inferiores a las utilizadas en cebada, donde la aplicación de dosis de fósforo de 60 kg/ha propiciaron los niveles más altos de fibra en detergente neutro en ese cultivo (Mehrvarz y Chaichi, 2008). Sin embargo, en ese mismo trabajo no se encontraron

diferencias importantes cuando aplicaron 30 kg P/ha/año, esta última cantidad se asemeja más a lo obtenido en este trabajo.

Las cantidades de fósforo requeridas para maximizar las características nutricionales del *T. laxum* están en un rango de 10 a 33 kg P/ha/año, niveles relativamente bajos con respecto a lo que se menciona para forrajes de corte como el *Sorghum bicolor* (L.) Moench, donde se obtienen óptimos resultados con cantidades de 80 kg P/ha/año (Patel, 2006), esto se puede atribuir a la presencia residual de P en el suelo producto de fertilizaciones previas (García y Ciampitti, 2009); a pesar que el fósforo presenta problemas de fijación en suelos de origen volcánico, manteniéndose poco disponible para la planta (Cabalceta, 1999).

Las dosis de potasio obtenidas en este experimento para alcanzar los máximos contenidos de materia seca y proteína cruda en la planta entera del *T. laxum*, permitieron superar la concentración de materia seca reportada en el sorgo negro con edades de 56 y 70 días de rebrote, pero es similar cuando se cosechó a 84 días (Elizondo-Salazar, 2004). Sin embargo, los contenidos de proteína cruda reportados en el sorgo negro a los 56, 70 y 80 días de rebrote fueron de 15,02%, 12,76% y 12,47%, respectivamente, los cuales superaron a los obtenidos en este trabajo.

El contenido de fibra en detergente neutro (FND) que se observó cuando el potasio fue suministrado al cultivo de Prodigioso, concuerda con un estudio realizado en maíz sembrado a 30, 50 y 70 cm de distancia entre plantas, donde se reportaron valores contenidos de FND en la hoja de 70,85%, 71,57% y 69,20%, en el orden de las distancias de siembra mencionado previamente, con una fertilización de 44 kg K/ha/año (Elizondo y Boschini, 2001).

Los contenidos máximos de cenizas fueron similares a lo reportado para Prodigioso con una edad de cosecha de 365 días, donde el promedio fue de 13,42% (Vargas, 2009); pero fueron más altos que los valores de 12,87%, 12,35%, 12,27% (Elizondo y Boschini, 2001) y 8,67% (Boschini-Figueroa y Elizondo-Salazar, 2004) reportados en maíz.

Los programas de fertilización se centran en combinar elementos para potenciar la respuesta del cultivo, evitando las interacciones entre los nutrientes que pueden afectar la absorción de un elemento con respecto a otro (Fageria, 2001). En el Cuadro 1 se pueden observar los resultados de la composición nutricional del *T. laxum* cuando se combinaron el nitrógeno, fósforo y potasio. El forraje utilizado mostró las mejores características nutricionales cuando las cantidades combinadas de nitrógeno, fósforo y potasio fueron 337,50 kg/ha/año, 90 kg/ha/año y 75 kg/ha/año respectivamente. El valor de materia seca obtenido con esta mezcla se ubica entre los más altos de todos los tratamientos; pero su aporte se enfoca en el contenido proteico que fue el más alto, así como el extracto etéreo y convenientemente el contenido de fibra en detergente neutro fue el segundo más bajo de todos los tratamientos. La desventaja radica en la proporción de cenizas que fue una de las más bajas en este estudio.

Dependiendo del contenido bromatológico que se quiera favorecer, ya sea aumentándolo como en el caso de la proteína o disminuyéndolo en el caso de las fibras, los niveles óptimos de N, P y K requieren diferentes dosis de fertilizante, por ejemplo, si se desea mejorar el contenido de materia seca en la hoja una aplicación de 110 kg/ha/año de N permite obtener un 24% de MS, siendo suficiente alrededor de 17 kg/ha/año de P y 94 kg/ha/año de K. Sin embargo, para lograr hasta un 14% en el contenido de proteína cruda de las hojas se requiere 398 kg de N/ha/año, con un efecto lineal sin tope de acumulación en el tallo. Con niveles de 22 kg/ha/año de P se logra acumular un 13% de proteína en la hoja y solamente se necesitan 68 kg/ha/año de P₂O₅ para un máximo similar de proteína.

Otro de los propósitos de la aplicación de fertilizantes en forrajes con frecuencias de corta es optimizar la producción de biomasa que además proporcione la más alta calidad nutricional posible. Si la intención es aumentar el contenido de materia seca, la mejor combinación se obtuvo con 35, 60 y 150 kg/ha/año de nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente. El porcentaje de materia seca logrado con esa combinación fue de 19,66%, pero mostró el nivel más bajo de proteína (8,98%) y el segundo más alto en fibra (70,44%). El porcentaje de materia seca y la proporción de proteína están correlacionados negativamente, mientras que

la fracción fibrosa puede aumentar conforme aumenta el contenido de materia seca (Juárez-Hernández y Bolaños-Aguilar, 2007). Con una cantidad más alta de potasio, aumentó el contenido de FND y disminuyó el porcentaje de proteína cruda, situación que se respalda con los resultados de pruebas realizadas en alfalfa, donde se observó una disminución en la concentración de la fracción fibrosa cuando se redujo la cantidad de potasio (Lissbran et al., 2009).

CONCLUSIONES

En las hojas del pasto Prodigioso se logró el mayor contenido de materia seca con dos posibles combinaciones, 414,20, 60 y 150 kg/ha/año de NPK, o con 225, 110,45 y 150 kg/ha/año de N, P, K, respectivamente, mientras que el mejor contenido de proteína cruda se logró con 337 kg de N/ha/año, 90 kg de P/ha/año, y 75 kg de K/ha/año, que fue la misma mezcla que dio los mejores resultados en planta entera.

La mezcla de nitrógeno, fósforo y potasio que favoreció las características nutricionales de los tallos fue la de 337,50, 90 y 225 kg/ha/año, respectivamente. Esta combinación les permitió a los tallos tener 12,98% de materia seca, 10,39 % de proteína cruda que fueron los más altos de todos los tratamientos, niveles intermedios de fibra en detergente neutro (66,38%) y cenizas (14,12%), y el segundo porcentaje más alto de extracto etéreo (1,68%).

LITERATURA CITADA

- Amador, A.L., y C. Boschini. 2000. Calidad nutricional de la planta de sorgo negro forrajero (*Sorghum alnum*) para la alimentación animal. *Agron. Mesoam.* 11(2):79-84.
- AOAC (Association of Official Analytical Chemistry). 2000. Official methods of analysis. 17th ed. AOAC Int., Gaithersburg MD, USA.
- AOAC (Association of Official Analytical Chemistry). 2002. Official methods of analysis. 19th ed. AOAC Int., WA, USA.
- Assuero, S.G., A. Mollier, and S. Pellerin. 2004. The decrease in growth of phosphorus-deficient maize leaves is related to lower cell production. *Plant Cell Environ.* 27:887-895. doi:10.1111/j.1365-3040.2004.01194.x
- Bednarz, C.W., and D.M. Oosterhuis. 1999. Physiological changes associated with potassium deficiency in cotton. *J. Plant Nutr.* 22:303-313. doi:10.1080/01904169909365628
- Bertsch, F. 1998. La fertilidad de los suelos y su manejo. Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, San José, CRC.
- Bidlack, J.E., J.E. Vaughan, and C.L. Dewald. 1999. Forage quality of 10 Eastern gamagrass (*Tripsacum dactyloides* (L.) L.) genotypes. *J. Range Manag.* 52:661-665. doi:10.2307/4003638
- Boschini, C. 2008. Diseños experimentales especiales en la investigación con ganado lechero. Serie Agrotecnología. vol 6. Editorial Universidad de Costa Rica, CRC.
- Boschini-Figueroa, C., y J.A. Elizondo-Salazar. 2004. Desarrollo productivo y cualitativo de maíz híbrido para ensilaje. *Agron. Mesoam.* 15:31-37. doi:10.15517/am.v15i1.11926
- Cabalceta, G. 1999. Fertilización y nutrición de forrajes de altura. En: Ministerio de Agricultura y Ganadería, editor, XI Congreso Agronómico Nacional/ III Congreso de Suelos. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, CRC. p. 239-254.
- Cástino, E.G. 2007. Pasturas: Estimación y modalidades de uso de fertilizantes en el mercado de pasturas. *Fertilizar* 7:10-17.
- Chen, C.P. 1992. *Tripsacum andersonii* J.R. Gray. In: L. 't Mannetje, and R.M. Jones, editors, Plant resources of South-East Asia. No. 4. Forages. Centre for Agricultural Publishing and Documentation (PUDOC), Wageningen, HOL. p. 228-230.

- Cherney, D.J.R., J.H. Cherney, and A.N. Pell. 1994. Inorganic nitrogen supply effects on alfalfa forage quality. *J. Dairy Sci.* 77:230-236. doi:10.3168/jds.S0022-0302(94)76945-9
- Cochran, W.G., and G.M. Cox. 1957. *Experimental designs*. 2nd ed. John Wiley & Sons, NY, USA.
- Cox, W.J., S. Kalonge, D. Cherney, and W.S. Reid. 1993. Growth, yield and quality of forage maize under different nitrogen management practices. *J. Agron.* 85:341-347. doi:10.2134/agronj1993.00021962008500020033x
- Elizondo, J., y C. Boschini. 2001. Efecto de la densidad de siembra sobre el rendimiento y calidad del forraje de maíz. *Agron. Mesoam.* 12:181-187.
- Elizondo-Salazar, J.A. 2004. Consumo de sorgo negro forrajero (*Sorghum almum*) en cabras. *Agron. Mesoam.* 15:77-80. doi: 10.15517/am.v15i1.11932
- Fageria, V.D. 2001. Nutrient interactions in crop plants. *J. Plant Nutr.* 24:1269-1290. doi:10.1081/PLN-100106981
- Frink, C.R., P.E. Waggoner, and J.H. Ausubel. 1999. Nitrogen fertilizer: retrospect and prospect. *Proc. Acad. Sci.* 96:1175-1180. doi:10.1073/pnas.96.4.1175
- García, F., e I. Ciampitti. 2009. Fertilización de forrajeras: algunas consideraciones para 2009. *Informaciones Agronómicas* 41:25.
- Goering, H.K., and P.J. Van-Soest. 1970. Forage fiber analyses (apparatus, reagents, procedures, and some applications). *Agricultural Handbook No. 379*. USDA, WA, USA.
- Horner, J.L., L.J. Bush, and G.D. Adams. 1985. Comparative nutritional value of Eastern Gamagrass and Alfalfa hay for dairy cows. *J. Dairy Sci.* 68:2615-2620. doi:10.3168/jds.S0022-0302(85)81145-0
- IMN (Instituto Meteorológico Nacional). 2010. Información climatológica de la zona de Ochoмого, Cartago. IMN, San José, CRC.
- Juárez-Hernández, J., y E.D. Bolaños-Aguilar. 2007. Las curvas de dilución de la proteína como alternativa para la evaluación de pastos tropicales. *Universidad y Ciencia* 23:81-90.
- Leblanc, O., D. Grimanelli, D. Gonzalez-de-Leon, and Y. Savidan. 1995. Detection of the apomictic mode of reproduction in maize-tripsacum hybrids using maize RFLP markers. *Theor. Appl. Genet.* 90:1198-1203. doi:10.1007/BF00222943
- Lissbrant, S., S. Stratton, S.M. Cunningham, S.M. Brouder, and J.J. Volenec. 2009. Impact of long-term phosphorus and potassium fertilization on alfalfa nutritive value-yield relationships. *Crop Sci.* 49:1116-1124. doi:10.2135/cropsci2008.06.0333
- Mehrvarz, S., and M.R. Chaichi. 2008. Effects of phosphate solubilizing microorganisms and phosphorus chemical fertilizer on yield and yield components of barley (*Hordeum vulgare* L.). *American-Eurasian J. Agric. Environ. Sci.* 3:822-828.
- Mlay, P.S., A. Pereka, E. Chikula-Phiri, S. Balthazary, J. Igusti, T. Hvelplund, M. Riis-Weisbjerg, and J. Madsen. 2006. Feed value of selected tropical grasses, legumes and concentrates. *Veterinarski Arh.* 76:53-63.
- Patel, P.C. 2006. Effect of phosphorus and potassium application on forage yield, quality, nutrient uptake and persistence of lucerne (*Medicago sativa* L.). In: International Union of Soil Science, editor, *The 18th World Congress of Soil Science*. International Union of Soil Science, Philadelphia, PA, USA. p. 165-173.
- Quintero, C.E., N.G. Boschetti, y R.A. Benavidez. 1997. Efecto residual y refertilización fosfatada de pasturas implantadas en Entre Ríos (Argentina). *Ciencia del suelo* 15:1-5.
- Romero, C., y O. Márquez. 2002. Efecto de la fertilización fosforada en pasto *Brachiaria humidicola* sobre la producción láctea de vacas de doble propósito. *Rev. Cient.* 12:578-580.
- Sánchez, J.M., y H. Soto. 1999. Calidad nutricional de los forrajes de una zona con niveles medios de producción de leche, en el trópico húmedo del norte de Costa Rica. *Agron. Costarricense* 23(2):165-171.
- SAS. 1985. *SAS user's guide: Statistics*. SAS Institute Inc. Cary, NC. USA.
- Soil Survey Staff, editor. 2014. *Keys to soil taxonomy*. 12th ed. USDA-Natural Resources Conservation Service, WA, USA.

- Sosa-de-Pro, E. 1979. Manual de procedimientos analíticos para alimentos de consumo animal. Universidad Autónoma de Chapingo, MEX.
- Soto, P., E. Jahn, y S. Arredondo. 2004. Mejoramiento del porcentaje de proteína en maíz para ensilaje con un aumento y parcialización de la fertilización nitrogenada. *Agric.Téc.* 64:156-162. doi:10.4067/S0365-28072004000200004
- Suyama, H., S.E. Benes, P.H. Robinson, G. Getachew, S.R. Grattan, and C.M. Grieve. 2007. Biomass yield and nutritional quality of forage species under long-term irrigation with saline-sodic drainage water: Field evaluation. *Anim. Feed Sci. Technol.* 135:329-345. doi:10.1016/j.anifeedsci.2006.08.010
- Tobía, C., y E. Villalobos. 2004. Producción y valor nutricional de forrajes de soya en condiciones tropicales adversas. *Agron. Costarricense* 28(1):17-25.
- Torres, M., y J. Lemos. 2009. Influencia de la fertilización con nitrógeno y azufre sobre la producción de forraje de raigrás anual. *Informaciones Agronómicas* 41:22-24.
- Vargas-Rodríguez, C.F. 2005. Valoración nutricional y degradabilidad ruminal de genotipos de sorgo forrajero (*Sorghum* sp.). *Agron. Mesoam.* 16:215-223. doi:10.15517/am16i2.11874
- Vargas-Rodríguez, C.F. 2009. Consumo y calidad del forraje *Tripsacum laxum* de un año de edad en cabras. *Agron. Mesoam.* 20:391-398. doi:10.15517/am.v20i2.4955
- Vásquez, A. 1982. Estudio detallado de los suelos de la Estación Experimental de Ganado Lechero El Alto. Universidad de Costa Rica, CRC.
- Veneciano, J.H., y K.L. Frigerio. 2008. Efecto de la fertilización nitrogenada en digitaria (*Digitaria eriantha* Steudel). *Informaciones Agronómicas* 37:12-16.

NOTAS

- 1 Este trabajo formó parte del proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría de Investigación, No 737-97- 006. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

© 2018 Agronomía Mesoamericana es desarrollada en la Universidad de Costa Rica
CC BY-NC-ND