

# Investigación costarricense en revistas extranjeras

## Factores de ansiedad subyacentes en sujetos con manía o hipomanía

Contreras J, J Affect Disord. 2011 Jul 18

Los sujetos con historia de manía o hipomanía presentan altos porcentajes de ansiedad comórbida. Se estudió la existencia de factores subyacentes en los rasgos ansiosos cuantitativos en pacientes con manía o hipomanía. Se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio del rasgo de ansiedad en 212 sujetos con historia de manía o hipomanía. Los participantes forman parte del estudio de Genética del Trastorno Bipolar en Costa Rica: parejas de hermanos. Dicha medición se realizó utilizando el STAI (subescala de rasgo) y el análisis se llevó a cabo mediante el método estadístico extracción de factores principales con correlación múltiple (Programa estadístico profesional SAS/SAT). El

modelo obtenido consta de tres factores y se caracterizó por tener una estructura simple y ser adecuado para la muestra estudiada (medida de la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin= 0.84 ( $> 0.6$ ), prueba de esfericidad de Bartlett= 2.4668E-162 ( $p < 0.05$ )). Los reactivos se agruparon en dos categorías: ausencia de ansiedad (factor 1) y presencia de ansiedad (factor 2 y factor 3). Según la naturaleza de los síntomas, los dos últimos factores fueron denominados miedo y rumiación. La interacción potencial de otros trastornos comórbidos con el puntaje de ansiedad y su relación con manía/hipomanía constituye la principal limitación del presente estudio. Se concluye que la existencia de dos factores subyacentes, miedo y rumiación podrían explicar la manifestación de síntomas ansiosos subsindrómicos en pacientes con manía o hipomanía en Costa Rica.