

- 2303 (USJ).
Telipogon christobalensis Kraenzl.
Hábito: Epífito.
Distribución general: CRI; 1800–3200 m.
Floración: Jun.
Especímenes testigos: *A. Cascante-Marín* 2348 (USJ).
Telipogon erratus (Dressler) N.H.Williams &
Dressler. *Stellilabium erratum* Dressler
Hábito: Epífito.
Distribución general: CRI; 1000–1750 m.
Floración: Oct.
Especímenes testigos: *A. Cascante-Marín* 2413 (USJ).
Telipogon vampyrus Braas & Horich
Hábito: Epífito.
Distribución general: CRI; 1000–1900 m.
Floración: Oct.
Especímenes testigos: *D. Bogarín* 5452 (JBL).

TRICHOSALPINX Luer
Trichosalpinx blaisdelli (S.Watson) Luer. *Pleurothallis*
blaisdelli S.Watson
Hábito: Epífito.
Distribución general: MEX-PAN; 0–1800 m.
Floración: Oct.
Especímenes testigos: *D. E. Mora s.n.* (USJ).
Trichosalpinx fruticosa Luer
Hábito: Epífito.
Distribución general: GTM, SLV, CRI; 1200–2400 m.

Floración: Abr.-May.
Especímenes testigos: *A. Cascante-Marín* 2338 (USJ).
Trichosalpinx nana (Ames & C.Schweinf.) Luer. *Pleuro-*
thallis nana Ames & C.Schweinf.
Hábito: Epífito.
Distribución general: CRI; 650–1900 m.
Floración: Mar., May.
Especímenes testigos: *A. Cascante-Marín* 1737
(USJ), 1701 (CR).

WARSCEWICZELLA Rchb.f.
Warscewiczella discolor (Lindl.) Rchb.f. *Warrea discolor*
Lindl.
Hábito: Epífito.
Distribución general: CRI-PAN, VEN, CUB; 700–
2000 m.
Floración: Mar.-May.
Especímenes testigos: *A. Cascante-Marín* 1699 (CR),
F. Pupulin 7442 (JBL).

XYLOBIUM Lindl.
Xylobium sulfurinum (Lem.) Schltr. *Maxillaria sulfurina*
Lem.
Hábito: Epífito.
Distribución general: MEX-PAN; 1000–1750 m.
Floración: Set.
Especímenes testigos: *A. Cascante-Marín* 1816 (CR),
2561 (USJ).

ANEXO 2

Orquídeas del bosque nuboso de los Cerros de La Carpintera, Cartago, Costa Rica recolectadas antes de 1940 y conocidas del sitio de estudio por solo un espécimen. Se indican el/los colectores, año de colecta y el acrónimo del herbario donde está depositado el espécimen de referencia.

Especie	Espécimen
<i>Dichaea morrisii</i> Fawc. & Rendle	<i>A. Brade & C. Brade</i> 1305; 1908 (MO)
<i>Lankesterella orthantha</i> (Kraenzl.) Garay	<i>A. Brade & C. Brade</i> 1187; 1923 (AMES)
<i>Lepanthes eximia</i> Ames	<i>P. H. Standley</i> 34345; 1924 (MO)
<i>Lepanthes gracillima</i> Endrés ex Luer	<i>A. R. Endrés</i> 24; 1867 (MO)
<i>Lepanthes lindleyana</i> Oerst. & Rchb.f.	<i>C. H. Lankester</i> 542; 1923 (MO)
<i>Malaxis carpinterae</i> (Schltr.) Ames	<i>H. Pittier & A. Tonduz</i> 4394; 1891 (US)
<i>Pleurothallopsis ujarensis</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>H. E. Stork</i> 1390; 1928 (MO)
<i>Ponthieva racemosa</i> (Walter) C.Mohr	<i>P. H. Allen</i> 650; 1937 (MO)
<i>Stelis aemula</i> Schltr.	<i>H. E. Stork</i> 2061; 1928 (MO)
<i>Stelis carpinterae</i> (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase	<i>A. Brade & C. Brade</i> 1214; 1908 (AMES)
<i>Stelis cooperi</i> Schltr.	<i>H. E. Stork</i> 1359; 1928 (MO)
<i>Stelis pompalis</i> (Ames) Pridgeon & M.W.Chase	<i>C. H. Lankester</i> 512; 1923 (AMES)
<i>Stelis standleyi</i> Ames	<i>H. E. Stork</i> 2723; 1928 (MO)