

BOTHIDAE

lenguados chuecos

Todos los bótidos abajo presentan un línea lateral con un arco grande arriba de la aleta pectoral (figuras de Gutherz 1967).

Bothus robinsi, chueco dos manchas – Dos manchas negras grandes en la aleta caudal, una detrás de la otra; cuerpo con puntos y moteado negro, una mancha grande en la línea lateral.

Bothus ocellatus, chueco playón – Dos manchas negras grandes en la aleta caudal, una arriba de la otra; cuerpo con puntos y moteado prominente, una mancha grande en la línea lateral.

Bothus lunatus, lenguado lunado – Perfil anterior con una hendidura distintiva frente al ojo inferior; aletas pectorales no alargadas. Cuerpo color pardo con anillos azul brillante, a veces interrumpidos; cabeza y aletas con manchas moteadas azules.

Bothus maculiferus, lenguado manchado – Perfil anterior convexo, sin una hendidura; radios de la aleta pectoral muy alargados en los machos. Cuerpo color pardo con anillos grandes y manchas difusas en los costados, puntos en la cabeza; 2 manchas grandes a lo largo de la línea lateral.

Engyophrys senta, lenguado ojicornudo – Boca muy pequeña, maxilla no llega detrás del margen anterior del ojo; espinas presentes en la arruga interorbital. Tres puntos negros a lo largo de la línea lateral.

Trichopsetta caribbea, lenguado del Caribe – Boca grande, maxilla llega a la mitad del ojo; no presenta espinas interorbitales. Puntos difusos a lo largo de las bases de las aletas dorsal y anal; un mancha oscura en la línea lateral debajo del extremo libre de la aleta pectoral.

Apuntes / Notes:

BOTHIDAE

lefeye flounders

All bothids mentioned below have a lateral line with a large arch over the pectoral fin (figures from Gutherz 1967).

Bothus robinsi, twospot flounder – Two large black spots on caudal fin, one behind the other; body with dark spotting and mottling, a large blotch on lateral line.

Bothus ocellatus, eyed flounder – Two large black spots on caudal fin, one above the other; body spotting and mottling pronounced, a large blotch on lateral line.


Bothus lunatus, peacock flounder – Anterior profile with distinct notch in front of lower eye; pectoral fins not prolonged. Body brown with large, often interrupted, bright blue rings; head and fins blue-spotted; 2 or 3 large blotches along lateral line.

Bothus maculiferus, mottled flounder – Anterior profile convex, without notch; pectoral-fin rays greatly produce in males. Body brown with large rings and diffuse blotches on sides, spots on head; 2 large blotches along lateral line.


Engyophrys senta, spiny flounder – Mouth very small, maxilla not reaching beyond anterior margin of eye; spines present on interorbital ridge. Three black spots along lateral line.

Trichopsetta caribbea, Caribbean flounder – Mouth large, maxilla reaching to mid-eye; no interorbital spines. Diffuse spots along bases of dorsal and anal fins; a dark spot on lateral line below tip of pectoral fin.


BOTHIDAE




Bothus robinsi




Bothus ocellatus




Bothus lunatus



Bothus maculiferus



Engyophrys senta



Trichopsetta caribbea