

## TETRAODONTIDAE tamboriles, botetes

***Canthigaster rostrata***, tamborín narizón – Una quilla carnosa anterior a la aleta dorsal. Color café arriba, canelo abajo; manchas oscuras en el pedúnculo caudal que se extienden en los lóbulos de la aleta caudal; líneas azules que irradian desde el ojo (Shipp 2002).

***Lagocephalus lagocephalus***, botete oceánico – Verde oscuro o azul arriba, blanco abajo. Origen de la aleta dorsal más cerca de la aleta caudal que a la base de la aleta pectoral; radios de la aleta pectoral usualmente 13 a 16 (Jordan & Evermann 1900).

***Lagocephalus laevigatus***, botete grande – Parte superior del cuerpo gris, plateado en los costados, vientre blanco; Origen de la aleta dorsal en el punto medio entre la aleta caudal y la base de la aleta pectoral; radios de la aleta pectoral usualmente 17 ó 18 (Jordan & Evermann 1900).

***Sphoeroides pachygaster***, botete chato – Cuerpo enteramente liso, carece totalmente de espinas. Color canelo arriba con manchas café oscuro; aleta caudal oscura con los extremos blancos (Martin 1978).

***Sphoeroides dorsalis***, botete jaspeado – Un par de flecos cerca de la línea media arriba de la aleta pectoral. Una a 5 manchas negras en los costados; machos con reticulaciones en el morro y la cabeza (Shipp 1974).

***Sphoeroides yergeri***, botete punteado – Costados con numerosos flecos blancos claros. Gris o café arriba, parte inferior de los costados con puntos negros; parte inferior de la aleta caudal oscura (Shipp 2002).

***Sphoeroides spengleri***, botete collar – Parte superior del cuerpo café o gris con algunas manchas negras grandes; una fila de manchas oscuras desde el mentón a la base de la aleta caudal; aleta caudal con una barra oscura en la base y en el margen posterior (Shipp 2002).

***Sphoeroides testudineus***, botete sapo – Líneas color canela a amarillento formando un oscelo en el dorso anterior a la aleta dorsal y formando polígonos en la parte superior del cuerpo; cabeza y parte inferior del cuerpo con manchas café oscuro (Jordan & Evermann 1900).

***Sphoeroides nephelus***, botete fruta – Gris oliva arriba; algunas veces con anillos color canela; una mancha oscura en la axila de la aleta pectoral y con frecuencia manchas café oscuro en la parte inferior de los costados (Jordan & Evermann 1900).

***Sphoeroides greeleyi***, botete verde – Pueden o no presentar flecos en la parte superior del cuerpo y los costados. Color canelo en la parte superior del cuerpo y más claro en la parte inferior, cubierta con manchas cafés oscuras; aleta caudal con una barra difusa en la base y en el margen posterior (Shipp 1974).

## TETRAODONTIDAE puffers

***Canthigaster rostrata***, sharpnose puffer – A fleshy keel before dorsal fin. Color brown above tan below; dark markings on caudal peduncle which extend onto caudal-fin lobes; blue lines radiating from eye.

***Lagocephalus lagocephalus***, oceanic puffer – Dark green or blue above, white below. Dorsal-fin origin closer to caudal fin than pectoral-fin base; pectoral-fin rays usually 13 to 16.

***Lagocephalus laevigatus***, smooth puffer – Upper body gray, sides silvery, belly white. Dorsal-fin origin midway between caudal fin and pectoral-fin base; pectoral-fin rays usually 17 or 18.

***Sphoeroides pachygaster***, blunthead puffer – Body entirely smooth, prickles totally lacking. Brown above with dark brown blotches; caudal fin dark with white lobes.

***Sphoeroides dorsalis***, marbled puffer – A pair of black flaps near midline above pectoral fin. One to 5 black blotches on sides; males with blue reticulations on snout and head.

***Sphoeroides yergeri***, speckled puffer – Sides with numerous light-colored flaps. Gray or brown above, lower sides with black spotting; lower half of caudal fin dusky.


***Sphoeroides spengleri***, bandtailed puffer – Upper body brown or gray with some large black spots; a row of dark blotches from chin to base of caudal fin; caudal fin with a dark bar at base and posterior margin.

***Sphoeroides testudineus***, checkered puffer – Tan to yellowish lines forming a “bullseye” on back before dorsal fin and forming polygons on upper body; head and lower sides with dark brown spots.

***Sphoeroides nephelus***, Southern puffer – Dark olive-gray above, often with pale tan rings; a black spot in axil of pectoral fin and often dark brown blotches along lower sides.

***Sphoeroides greeleyi***, green puffer – Flaps on upper body and sides present or not. Tan upper body and paler lower sides covered with irregular dark brown blotches; caudal fin with diffuse bar at base and posterior margin.


## TETRAODONTIDAE




*Canthigaster rostrata*



*Lagocephalus lagocephalus*




*Lagocephalus laevigatus*




*Sphoeroides pachygaster*




*Sphoeroides dorsalis*




*Sphoeroides yergeri*



*Sphoeroides spengleri*



*Sphoeroides testudineus*



*Sphoeroides nephelus*



*Sphoeroides greeleyi*